

GEBRAUCHSINFORMATION – BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

EUCAPIL™

Haarpflegemittel zur äußeren Anwendung. Dermatologisch getestet.

INGREDIENTS:

Isopropyl Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, Fluridil


WAS IST EUCAPIL™?

EUCAPIL™ ist ein neues Kosmetikum, das von Biophysica, Inc. in San Diego, Kalifornien, entwickelt wurde. EUCAPIL™ trägt dazu bei, den Zustand der Haare zu verbessern und hilft, sie in der Kopfhaut zu festigen. Es ist ausschließlich zur äußerlichen, topischen Anwendung auf der Kopfhaut bestimmt. Es wird nicht in den Körper aufgenommen und wirkt nur auf den Hautbereich, auf den es aufgetragen wurde. EUCAPIL™ schützt die Haarwurzeln vor allmählichen Veränderungen, die bei Personen mit genetischer Veranlagung zu einer Schwächung und Ausdünnung der Haare führen (Abb. 1). EUCAPIL™ wurde an der dermatologischen Abteilung einer Universitätsklinik getestet*. Die tägliche Anwendung von EUCAPIL™ war bei der Mehrheit der Anwender wirksam und bei allen sicher. Die Wirksamkeit von EUCAPIL™ hängt von der Lebensfähigkeit der verbliebenen Haarfollikel ab.

WANN SOLLTE MIT DER ANWENDUNG VON EUCAPIL™ BEGONNEN WERDEN?

Die Wirksamkeit von EUCAPIL™ hängt vom Zustand der Haarfollikel ab. Im Laufe der Zeit wirken sich Veränderungen in den Haarfollikeln auf die Gesundheit der Haare aus. Je früher mit der Anwendung von EUCAPIL™ begonnen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Haarqualität erhalten bleibt.

Abbildung 1: Haarwurzel
Angenommener Wirkmechanismus
von Eucapil™



< = Bereiche, die am Haararfall
beteiligt sind

◀● = Blockierung dieser Bereiche durch Eucapil

● = Eucapil™

Patente: WO 0158854, US 09/580503, EP 1169301, EP 1144366

Der normale Haarwuchszyklus beträgt 3–8 Jahre, bei altersbedingten Veränderungen kann er kürzer sein. Die Ergebnisse der Anwendung von EUCAPIL™ hängen von der Dauer der Anwendung und dem Zustand der Haarwurzeln ab.

Zu erwartende Wirkung:

- Die Verbesserung der Funktionalität der Haare und ihre Festigung in der Kopfhaut kann in etwa 4–6 Wochen eintreten.
- Eine Verbesserung der Haarqualität kann nach etwa 5–6 Monaten eintreten, da der Haardurchmesser wächst und somit das Haarvolumen zunimmt. Bei Anwendern, bei denen die Haarwurzeln noch funktionsfähig sind, kann sich der Haarschaft weiter verdicken.

WARNHINWEISE

EUCAPIL™ ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und darf ausschließlich nur auf die Kopfhaut aufgetragen werden. Achten Sie darauf, dass EUCAPIL™ nicht in die Augen gelangt. Sollte dies dennoch geschehen, spülen Sie die Augen wiederholt mit Wasser aus. Es wird empfohlen, die Kopfhaut nicht längere Zeit der Sonne auszusetzen. Sonnenbrände können durch EUCAPIL™ verschlimmert werden. Weißes Haar kann einen leicht gelblichen Farbschimmer annehmen, der sich jedoch leicht wieder auswaschen lässt. Die Struktur von EUCAPIL™ wurde so konzipiert, dass es sich bei Kontakt mit wasserhaltigen Flüssigkeiten abbaut. Deshalb sollte EUCAPIL™ ausschließlich auf die völlig trockene Kopfhaut aufgetragen werden und der Inhalt einer geöffneten Ampulle sollte nicht längere Zeit der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.

Vorsicht! Der Inhalt ist brennbar: von offenen Flammen fernhalten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht einnehmen.

EUCAPIL™ unmittelbar vor oder während der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit nicht anwenden.

Bei Personen, die für Hauterkrankungen anfällig sind, kann die dauerhafte Anwendung von Isopropylalkohol, der in EUCAPIL™ enthalten ist, vorübergehend Hautreizungen hervorrufen.

ART DER ANWENDUNG

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte EUCAPIL™:

- Direkt auf den betroffenen Teil der Kopfhaut aufgetragen werden.
- Nach der Anwendung von EUCAPIL™ sollte der Kontakt der Kopfhaut mit Wasser vermieden werden, es wird empfohlen, die Haare frühestens eine Stunde nach der Anwendung von EUCAPIL™ zu waschen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN APPLIKATOR

- Den oberen Teil der Ampulle an der gekennzeichneten Linie mit leichtem Druck vorsichtig abbrechen.
- Den Applikator auf die geöffnete Ampulle aufsetzen (Abb. 2).
- Vor dem Spiegel auftragen.
- EUCAPIL™ direkt auf die Kopfhaut (nicht auf das Haar) auftragen. Kopf leicht nach hinten neigen, um das Auftragen zu erleichtern und zu verhindern, dass EUCAPIL™ in die Augen gelangt.
- Die Lösung durch wiederholtes Pressen des Applikators mit kreisförmigen Bewegungen auftragen.
- Den gesamten Inhalt der Ampulle leicht in die Kopfhaut einmassieren, um die Aufnahme durch die Haut zu verbessern.



Abbildung 2: Ampulle mit Applikator

WIE UND WANN IST EUCAPIL™ ANZUWENDEN?

Die empfohlene Dosierung ist eine Ampulle (2 ml), täglich vor dem Schlafengehen auf die Kopfhaut auftragen.

AUFBEWAHRUNG:

Nicht über 25 °C und vor Licht geschützt aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSE: 30 Ampullen zu je 2 ml.

HERSTELLER

 **INTERPHARMA
PRAHA, a.s.**

Komoranska 955
143 10 Praha 4, Tschechische Republik
Tel.: +420 241 773 214
e-mail: interpharma@ipp-otsuka.cz
website: www.interpharma-praha.com

- *Forschungsarbeiten: 1) M. Sovak, M.D., A. L. Seligson, Ph.D., R. Kucerova, M.D., M. Bienova, M.D. et al.: Fluridil, a Rationally Designed Topical Agent for Androgenetic Alopecia: First Clinical Experience. *Dermatologic Surgery*, Volume 28, Issue 8, 678-685 (2002).
- 2) A. L. Seligson, B. K. Campion, J. W. Brown, R. C. Terry, R. Kucerova et al.: Development of Fluridil, a Topical Suppressor of the Androgen Receptor in Androgenetic Alopecia. *Drug Development Research* 59: 292-306 (2003).
- 3) M. Bienova, M.D., R. Kucerova, M.D., M. Fiaruskova, M. Sovak, M.D.: Efficacy and Safety of Local Antiandrogen Fluridil in Hirsutism. *Proceedings of 14th Congress of European Academy of Dermatology and Venerology*, London, October 12-16, (2005).
- 4) R. Kucerova, M.D., M. Bienova, M.D., R. Novotny, M. Hajdich, M.D., M. Fiaruskova, A. L. Seligson, Ph.D., M. Sovak, M.D.: Fluridil in Female Androgenetic Alopecia: Efficacy and Safety after 9-month Use. *Proceedings of 14th Congress of European Academy of Dermatology and Venerology*, London, October 12-16, (2005).